

GASTROSKOPIA

Przygotowanie do badania:

Badanie gastroskopowe nie wymaga szczególnych przygotowań

- rano w dniu badania pacjent powinien przyjąć stale stosowane leki, z wyjątkiem leków na cukrzyce
- 6 godzin przed badaniem nie należy nic jeść (dłużej w przypadku zaburzeń opróżniania żołądka)
- 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić (również wody!)
- na kilka godzin przed gastroskopią nie należy palić papierosów, ani rzuć gumy
- UWAGA !!! Osoby, które stosują leki wpływające na krzepliwość krwi - powinny poinformować o tym lekarza przed planowanym badaniem

Postępowanie u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe przed diagnostyczną gastroskopią:¹⁾

- Pacjenci przyjmujący kwas acetylosalicylowy (ASA) i/lub leki p/płytkowe tj. kłopidogrel, prasugrel, tikagrelor – nie muszą przerywać leczenia
- Pacjenci przyjmujący nowe doustne antykoagulanty (NOAC), tj. dabigatran, rywaroksaban, apiksaban, enoksaban – opuścić 1 dawkę NOAC rano w dniu badania, wznowić leczenie w następnej dobie
- Pacjenci przyjmujący leki z grupy antagonistów witaminy K (VKA), tj. acenokumarol, warfaryna – nie muszą odstawiać leku, jeśli oznaczony wskaźnik INR tydzień przed badaniem jest w zakresie terapeutycznym

¹⁾Opracowane na podstawie wytycznych: Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy, including direct oral anticoagulants: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guidelines. Endoscopy 2016; 48: 1–18