

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII

preparatem Fortrans

Na badanie kolonoskopii należy zgłosić się 30 min przed planowaną godziną badania z osobą towarzyszącą! Tego dnia po badaniu nie wolno prowadzić samochodu.

Na tydzień przed badaniem należy odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Acard, Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego. W przypadku pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać po ok. 14 dniach roboczych tylko na podstawie opisu badania wydanego przez lekarza po badaniu.

KROK 1

Do badania kolonoskopii całe jelito powinno być prawidłowo oczyszczone, aby tak było należy zastosować odpowiednią dietę.

48 godzin przed badaniem: dieta ubogo resztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata. Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy, barwiących soków (np. buraczane).

24 godziny przed badaniem: nie wolno już jeść, tylko dieta płynna - woda, herbata, przecedzony bulion, klarowane soki Osoby chorujące na cukrzycę mogą np. pić słodzone napoje bądź kisiel bez cząstek.

KROK 2

W celu dobrego oczyszczenia jelita grubego należy zastosować preparat przeczyszczający FORTRANS.

OPCJA 1': Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 7:00 a 12:00.

W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 16:00 należy przygotować 4 litry roztworu Fortrans, rozpuszczając każdą z 4 torebek w 1 litrze niegazowanej wody. Przygotowany roztwór należy wypić w przeciągu 4-6 godzin, 1 szklanka co około 15 minut.

OPCJA 2': Badanie odbywa się w godzinach popołudniowych tj. między 13:00 a 18:00.

W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 18:00 należy przygotować 2 litry roztworu Fortrans, rozpuszczając 2 z 4 torebek każdą w 1 litrze niegazowanej wody. Przygotowany roztwór należy wypić w przeciągu 2 godzin, 1 szklanka co 15 minut. – W dniu badania, około 6:00 rano należy przygotować 2 litry roztworu Fortrans, rozpuszczając pozostałe 2 torebki preparatu Fortrans, każdą w 1 litrze niegazowanej wody. Przygotowany roztwór należy wypić w przeciągu 2 godzin, 1 szklanka co 15 minut. **WODĘ MOŻNA PIĆ DO SAMEGO BADANIA !**

W przypadku kiedy badanie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym w dniu badania (6 godzin przed badaniem) nie wolno już pić płynów!

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII p

reparatem Citra Fleet

Na badanie kolonoskopii należy zgłosić się 30 min przed planowaną godziną badania z osobą towarzyszącą! -Tego dnia po badaniu nie wolno prowadzić samochodu.

Na tydzień przed badaniem należy odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Acard, Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.

W przypadku pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać po ok. 14

dniach roboczych tylko na podstawie opisu badania wydanego przez lekarza po badaniu.

KROK 1

Do badania kolonoskopii całe jelito powinno być prawidłowo oczyszczone, aby tak było należy zastosować odpowiednią dietę. 48 godzin przed badaniem: dieta ubogo resztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata.

Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy, barwiących soków (np. buraczane).

24 godziny przed badaniem: nie wolno już jeść, tylko dieta płynna - woda, herbata, przecedzony bulion, klarowane soki Osoby chorujące na cukrzycę mogą np. pić słodzone napoje bądź kisiel bez cząstek.

KROK 2

W celu dobrego oczyszczenia jelita grubego należy zastosować preparat przeczyszczający CITRAFLEET.

OPCJA 1': Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 7:00 a 12:00. - O godzinie 15:00 dzień przed badaniem należy rozpuścić jedną saszetkę preparatu CITRAFLEET w 150ml zimnej wody, ciągle mieszając przez 2-3minuty. Roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu i popić szklanką wody. - O godzinie 21:00 dzień przed badaniem należy przyjąć drugą porcję preparatu.

OPCJA 2': Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 13:00 a 18:00. - O godzinie 21:00 dzień przed badaniem należy rozpuścić jedną saszetkę preparatu CITRAFLEET w 150ml zimnej wody, ciągle mieszając przez 2-3minuty. Roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu i popić szklanką wody. - O godzinie 06:00 w dzień badania należy przyjąć drugą porcję preparatu. PO KAŻDEJ Z TYCH SASZETEK NALEŻY WYPIĆ MINIMUM 2 LITRY WODY NIEGAZOWANEJ !!!! WODĘ MOŻNA PIĆ DO SAMEGO BADANIA !

W przypadku kiedy badanie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym w dniu badania (6 godzin przed badaniem) nie wolno już pić płynów!